

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública	VACUNACIÓN DE ADOLESCENTES Y PREADOLESCENTES FRENTE A COVID-19	Fecha: 4/08/2021
--	--	-----------------------------

AUTORIZACIÓN PARA VACUNACIÓN FRENTE A COVID 19 DE PERSONAS MENORES DE 16 AÑOS

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar infección en los seres humanos. El SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus, que afecta a los humanos y se transmite de persona a persona, a través del contacto de la mucosa de las vías respiratorias o las conjuntivas de la persona susceptible con las secreciones respiratorias de la persona que presente una infección activa.

En los casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. En algunos casos, los síntomas y secuelas pueden prolongarse en el tiempo bastantes semanas o incluso meses.

La vacunación es la principal medida de prevención contra COVID 19.

La autorización de las vacunas frente a la COVID 19 implica que los beneficios de su administración superan ampliamente los riesgos conocidos.

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios. En el caso de presentarse, son leves o moderados y tienen una duración aproximada de 2 o 3 días. Entre estas reacciones, se incluye: Sensibilidad, dolor e inflamación en la zona de inyección: fatiga, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, fiebre o escalofríos y náuseas. Muy raramente se han descrito miocarditis o pericarditis asociadas a la vacunación.

Si después de vacuna aparece alguno de los efectos enumerados en el párrafo anterior puede utilizarse un tratamiento sintomático, con analgésicos o antipiréticos (como paracetamol) para tratar estos efectos, sin influir en la respuesta inmune. Si fuese necesario puede consultar con el personal de Atención Primaria, en especial si presenta dificultad al respirar, palpitaciones o dolor en el pecho.

Si la reacción es leve también podrá notificarla de forma electrónica a través de la dirección web <https://www.notificaram.es/> o en la página de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de su apartado enlaces de interés <http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion>.

AUTORIZACIÓN PARA VACUNACIÓN DE MENORES DE 16 AÑOS

D. /D^a _____, con DNI _____,
como madre/padre/ tutor o representante legal de

D. /D^a _____, con DNI _____, y
SIP: _____

Autorizo a que se le administre la vacuna frente a COVID 19.

Fecha:/...../202....

Firma

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública	VACUNACIÓ DE ADOLESCENTS I PREADOLESCENTS ENFRONT DE COVID-19	Fecha: 4/08/2021
--	--	-----------------------------

AUTORITZACIÓ PER A VACUNACIÓ ENFRONT DE COVID 19 DE PERSONES MENORS DE 16 ANYS

Els coronavirus són una àmplia família de virus que poden causar infecció en els éssers humans. El SARS-CoV-2 és un tipus de coronavirus, que afecta els humans i es transmet de persona a persona, a través del contacte de la mucosa de les vies respiratòries o les conjuntives de la persona susceptible amb les secrecions respiratòries de la persona que presente una infecció activa.

En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per a respirar, fallada renal i fins i tot la mort. En alguns casos, els símptomes i seqüeles poden prolongar-se en el temps bastants setmanes o fins i tot mesos.

La vacunació és la principal mesura de prevenció contra COVID 19.

L'autorització de les vacunes enfront de la COVID 19 implica que els beneficis de la seua administració superen àmpliament els riscos coneguts.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou: Sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció: fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o esgarrafances i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Si després de la vacuna apareix algun dels efectes enumerats en el paràgraf anterior pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si fora necessari pot consultar amb el personal d'Atenció Primària, especialment si presenta dificultat per a respirar, palpitations o dolor en el pit.

Si la reacció és lleu també podrà notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web <https://www.notificaram.es/> o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del seu apartat enllaços d'interés <http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion>.

AUTORITZACIÓ PER A VACUNACIÓ DE MENORS DE 16 ANYS

D. /*D^a _____, amb
DNI _____, com a mare/pare/ tutor o representant legal de D.

/*D^a _____, amb DNI _____, i

*SIP: _____

Autoritze al fet que se li administre la vacuna enfront de COVID 19.

Data:/...../202....

Signatura