

## Vacuna Bexsero

### Información de la vacuna frente al meningococo B

Es una **infección bacteriana** provocada por el meningococo que, cuando se activa, puede producir meningitis (inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal). Esta es una enfermedad de **baja incidencia**, raramente se produce enfermedad meningocócica y **actualmente no hay ningún brote ni epidemia activa**.







Es necesaria la receta prescrita por el pediatra



**INCIDENCIA**  
**0,3**  
casos de meningitis B por cada 100.000 habitantes/año

## DOSIS RECOMENDADAS

 <b>GRUPO DE EDAD</b>	 <b>Inmunización primaria</b>	 <b>Intervalo entre dosis primarias</b>	 <b>Dosis de recuerdo</b>
<b>Lactantes de 2 a 3 meses de edad<sup>a</sup></b>	<b>3 DOSIS</b>	<b>&gt; 1 mes</b>	<b>1 dosis</b> entre los 12 y 15 meses de edad (intervalo desde la última de la primovacunación: no menos de 6 meses) <sup>b</sup>
<b>Lactantes de 3 a 5 meses de edad</b> Nueva pauta: 2+1	<b>2 DOSIS</b>	<b>&gt; 2 mes</b>	
<b>Lactantes no vacunados de 6 a 11 meses de edad</b>	<b>2 DOSIS</b>	<b>≥ 2 meses</b>	<b>1 dosis</b> en el segundo año de vida con un intervalo de al menos dos meses entre la primovacunación y la dosis de recuerdo.
<b>Lactantes no vacunados de 12 a 23 meses de edad</b>			<b>1 dosis</b> con un intervalo de 12 a 23 meses entre la primovacunación y la dosis de recuerdo.
<b>Niños de 2 años a 10 años de edad</b>	<b>2 DOSIS</b>	<b>≥ 1 mes</b>	<b>No se ha establecido<sup>d</sup></b>
<b>Adolescentes (desde 11 años de edad) y adultos<sup>c</sup></b>			

Diseño: MICOF

(a) La 1ª dosis no antes de los 2 meses de edad. La seguridad y eficacia de Bexsero en lactantes de menos de 8 semanas no se ha establecido.  
 (b) En caso de retraso en la administración, la dosis de refuerzo no debería administrarse después de los 24 meses de edad.  
 (c) No hay información en adultos de más de 50 años de edad.  
 (d) La necesidad de dosis de refuerzo no ha sido establecida.